

Nursing Procedure:Pt Discharge

נוהל שחרור

הצוות הסיעודי ישחרר מהמיון ילדים לאחר:

- ❖ גסטרואנטריטיס.
- ❖ חבלות ראש.
- ❖ חתכים-תפירה והדבקה.
- ❖ לאחר קבלת זריקת דחף (טטנוס דיפטריה) .D.T.
- ❖ לאחר קיבוע גבס בגפה.
- ❖ ברונסיאוליטיס.

- ✓ אחות אחראית משמרת תהיה אחראית על השחרור, המטופלים יסומנו כבר בטריאז' ע"י כוכבית.
- ✓ כל גיליון המסומן עם כוכבית יוכנס לקופסא מתאימה –בחדר הכירורגי תהיה קופסא עם דפי הדרכה.
- ✓ כל מטופל יקבל הדרכה בע"פ וכן דף הסבר.
- ✓ אחות משחררת תיכתב בדף מעקב (אנמנזה) שנתנה הדרכה, תחתום, וגם המטופל יחתום ליד.
- ✓ ההדרכה תינתן או בחדר כירורגי או בחדר אחר-לא בפרוזדורים ולא בדלפק השחרור והקבלה.
- ✓ במידה ואחות נתקלת בבעיה או שיש לה הארה או הערה לגבי השחרורים לפנות לציפי או לזהבה.

בברכת החלמה מהירה ובתודה

שפנית אלינו לקבלת שירות

צוות חדר מיון שניידר

תפירה והדבקה חתכים

בעקבות פציעה יש לעיתים צורך בהדבקה או תפירה של פצע המאפשרת ריפוי מלא.
הדבקה או תפירה נעשית על פי שיקול דעת הרופא, ההדבקה או התפירה נעשית לאחר ניקוי וחיטוי יסודי.

מס' כללים שיסייעו בריפוי מלא של הפצע:

- ❖ במקרה של הדבקה לשמור על הפצע נקי ויבש מס' שעות – אין לכסות את הפצע.
- ❖ אין צורך לכסות אזור לאחר ההדבקה.
- ❖ אין להרטיב את הפצע שנתפר במשל 48 שעות הראשונות אזור תפרים ניתן לשטוף בעדינות במים וסבון-לא לשפשף את המקום.
- ❖ לא להיכנס לבריכה או ים למשך 5 ימים.

ב-24 שעות ראשונות לאחר תפירה או הדבקה

- ❖ ניתן לקחת תרופות נגד כאבים (לפי הוראות הרופא).
- ❖ במידה והתפרים הם באזור המרפק, או הברך להימנע מתנועות באזור.

הוראות נוספות:

- טיפול אנטיביוטי על פי הוראת רופא.
- ❖ הוצאת תפרים בקהילה ע"פ הוראות הרופא.

במידה ויופיעו הסימנים הבאים לפנות מיד לרופא:

- ✓ דימום מאזור פצע או הדבקה.
- ✓ עלית חום גבוה מעל 38 מעלות.
- ✓ נפיחות ואודם באזור התפר.
- הפרשה מאזור התפרים.

בברכת החלמה מהירה ובתודה
שפנית אלינו לקבלת שירות
צוות חדר מיון שניידר

הוראות למטופל לאחר קיבוע גבס בגפה

כדי לאפשר החלמה ולמנוע סיבוכים, לפניך מספר הנחיות שיקלו עליך את הטיפול לאחר פציעתך:

ב-24 השעות הראשונות:

- ✓ אפשר לקחת תרופות נגד כאבים על פי הוראות. ה רופא.
- ✓ יש להרים את הגפה המגובסת בעזרת מתלה או כרית, ולהפעיל את האצבעות (כדי להוריד את הנפיחות המופיעה כתוצאה מהשבר).
- ✓ בכדי לאפשר התייבשות מתאימה של הגבס-יש להימנע באופן מוחלט מכיסוי.

לאחר 24 שעות:

- ✓ אין לדרוך על גפה מגובסת (עד להרכבת עקב הליכה).
- ✓ אין להרטיב את הגבס (בזמן רחצה אפשר לכסות את הגפה המגובסת בשקית ניילון).
- ✓ להימנע מהחזרת חפצים חדים בין הגפה לגבס.
- ✓ להימנע ממריחת לק על הציפורניים.
- ✓ המשך מעקב וביקורת על פי ההנחיות הכותבות המבכתב השחרור.

במידה ומופיעים בגפה המגובסת אחד מהסימנים הבאים –עליך
לפנות מיד לחדר המיון.

- נפיחות קשה באצבעות עם הרגשת לחץ.
- כאבים חזקים ובלתי נסבלים, גם לאחר נטילת משככי כאבים והגבהת הגפה.
- שינוי בצבע האצבעות לכחול או ללבן, שינוי בטמפרטורת הגפה לעומת הגפה הבריאה.

בברכת החלמה מהירה ובתודה
שפנית אלינו לקבלת שירות
צוות חדר מיון שניידר

דף הדרכה לאחר זריקת דחף-טטנוס דיפטריה

זריקת דחף – טטנוס דיפטריה ניתנת למניעת מחלת ה טטנוס.

לאחר ההזרקה יכולות להופיע התופעות הבאות:

1. אודם מקומי.
2. נוקשות של המקום.
3. כאבים בזרוע ובבית השחי.
4. אפשרות לעליית חום לאחר מתן החיסון.

בדרך כלל, לאחר 3 ימים, התופעות חולפות מעצמן.

אפשר לטפל במקום ההזרקה ע"י הרטבות קרות, ניתן לקחת טבליה נגד כאבים המומלצת על ידי הרופא המטפל במרפאה.

כל תופעה נוספת או המשך התופעות מעבר לתקופה הנ"ל-יש לפנות לרופא
המטפל

בברכת החלמה מהירה ובתודה
שפנית אלינו לקבלת שירות
צוות חדר מיון שניידר

דף מידע בנושא: הטיפול לאחר פגיעת ראש

שלום רב,
לאחר בדיקה הרופא החליט, כי אינך זקוק לטיפול והשגחה בבית החולים.
הנך משוחרר עם ההמלצות הבאות:
(1) מנוחה ל-24 שעות בבית.
(2) מזון ושתייה קלים.
(3) ניתן לקחת תרופות נוגדות כאבים.

במידה ויופיע אחד מהסימנים הבאים עליך לפנות בהקדם לרופא או לתדר מיון להערכה מחודשת:

1. שינה או נמנום ממושך מהרגיל.
2. הקאות מרובות. (יותר מ-3)
3. שינוי כל שהוא בהתנהגות או במצב ההכרה.
4. פרכוסים.
5. דימום מהאף או מהאוזן.
6. כאבי ראש עזים או טשטוש ראיה.

ב-24 שעות ראשונות רצוי לא להשאיר לבד ילד/ה

ביקורת ומעקב אצל רופא מטפל.

בברכת החלמה מהירה ובתודה
שפנית אלינו לקבלת שירות
צוות חדר מיון שניידר